
 식품의약품안전처		<h1>보도자료</h1>		
보도일시	배포 즉시		배포일자	2021. 10. 21.(목)
담당과장	식중독예방과 김성일 (☎043-719-2101)		담당자	김윤정 사무관 (☎043-719-2102)

겨울철 어린이집 식중독 예방을 위한 합동 점검 실시

- 어린이집 집단급식소 5,400개소 급식 지도·점검-

- 식품의약품안전처(처장 김강립)는 겨울철 노로바이러스 식중독 사고 예방을 위해 10월 25일부터 11월 26일까지 어린이집 집단급식소 5,400여 곳을 대상으로 지방자치단체와 함께 식중독 예방 합동 점검을 실시합니다.
- 식약처는 ‘2021년 어린이집 집단급식소 점검계획’에 따라 전국 어린이집 집단급식소(1만1,700여 개소) 중 상반기에 6,291개소를 점검*했으며, 이번 점검은 상반기 미점검 급식시설이 대상입니다.
 - * 점검결과 : 6,291개소 점검, 위반 17건(건강진단 미실시 14건, 유통기한 경과제품 보관 2건, 영업자 준수사항 위반 1건)
- 주요 점검 내용은 ▲건강진단 실시 여부 ▲유통기한 경과제품 사용·보관 ▲식품의 위생적 취급 여부 ▲급식시설 및 기구 세척·소독 관리 ▲보존식 보관 여부 등입니다.
 - 아울러, 겨울철 대표적인 노로바이러스 식중독 예방을 위한 손씻기 등 개인위생 관리 점검·교육, 노로바이러스 의심환자 발생 시 행동요령 등에 대한 안내·홍보 등을 병행할 예정입니다.
- 어린이 집단급식소에서 식중독이 발생할 경우 많은 환자가 발생할 우려가 있으므로 종사자와 어린이들은 식중독 예방 수칙을 적극적으로 실천해야 합니다.

- 참고로 최근 5년간 연평균 식중독 발생은 312건, 6,227명이었고 그 중 집단급식소 발생 식중독은 60건(19%) 2,980명(48%)을 차지해 어린이집 등 집단급식소의 위생 안전관리가 매우 중요합니다.

□ 식약처는 앞으로도 어린이집 등의 집단급식소에 대해 지속적인 점검과 식중독 예방교육을 병행하는 등 안전한 어린이 급식환경 조성에 최선을 다하겠습니다.

<붙임> 노로바이러스 식중독 예방 요령

노로바이러스 식중독 예방요령

노로바이러스란?

10~100개의 입자로도 감염을 일으키고, 전염성이 강하며 급성 위장염을 유발하는 바이러스.



노로바이러스 감염 증상

잠복기간 12~48시간

주요 증상

설사, 구토, 구역질, 복통



기타 증상

발열, 두통, 몸살



노로바이러스 식중독 감염 경로

음식 또는 물 또는 환경



오염된 음식

오염된 물



감염자와 함께 식사

감염자가 만든 음식

감염자의 분변이나 구토물

노로바이러스 식중독 예방요령



손은 흐르는 물에
비누를 30초 이상
가득 씻기



물은
끓여 마시기



식대에는 깨끗한 물로
세척하기
다른 사람에게 튀지 않게 주의



음식은 충분히
확열하기
이동하는 음식은 피하기,
냉기 주의하기



노로바이러스 감염자와 접촉을 금하고
음식섭취 시 개인 식기 사용하기

노로바이러스 식중독 예방요령



싱글레서 화장실 또는 구급장에서는
편지 투입통 달고 물 내리고,
편지를 화장지로 소독하기



구급장엔 소독약을 적신 휴지(타올로
5% 용도) 덮고 수거하고
폐기할 때까지 주의하기



편지, 수거지 등 휴지통 소독할 때
소독제를 도포하고 10분 후
폐기물 처리 또는 불소독 후 처리



노로바이러스 감염자는 조리하지 않고
음식(나간) 후에도
최소 2-3일간 식용수용 불하기